



CATALOG DE SOIURI
MARTONVÁSÁR

GRÂU



MV NEMERE

Este un soi cu stabilitate excelentă la recoltare, un soi timpuriu și cu randament ridicat. Poate fi cultivat cu tehnologie intensivă, fiind un soi top. În funcție de intensitatea producției, calitatea pentru industria de panificație poate varia între B1 și A2 de la un an la altul. Are o rezistență complexă împotriva bolilor.

PRODUCTIVITATE POTENȚIALĂ

9,0 - 10,0 t/ha

Szombathely (FIT)	11,96 t/ha
Mosonmagyaróvár (FIT)	10,69 t/ha
Felsőszemeréd	9,82 t/ha
Szarvas (FIT)	9,00 t/ha
Reménypuszta	8,67 t/ha
Füzesabony (FIT)	8,03 t/ha
Szerencs	8,03 t/ha
Bóly (FIT)	8,02 t/ha

Rezultatele recoltei 2023
(FIT: experiment post-înregistrare pe parcele mici)

CALITATE CARACTERISTICĂ

Tipul semintelor	boabe mari, sticlos (spic aristat)
Greutate de o mie de boabe	45 - 50 g
Conținut de proteină brută	12 - 14 %
Conținut de gluten umed	29 - 32 %
Grup Farinograf	A2

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

Recomandat pentru cultivare intensivă: cu o mare completare de nutrienți, și cu un nivel tehnologic de doua tratamente fungicide. Crește viguros, nu trebuie semănat prea des! Cu un semănat adaptat la vreme, dar nu mai târziu de a doua decadă a lunii octombrie se recomandă însămânțarea, cu o rată de semințe de 4,0-4,5 milioane de germini/hectar. Recomandat doza de îngrășământ de 150-180 kg/ha ingredient azot activ.

REZISTENȚA LA BOLI

Făinare (<i>Blumeria graminis</i>)	
Rugina galbenă	
Rugina frunzelor	
Rugina tulpinilor	
Pătarea reticulară a frunzelor	
Fuzarioză	

Datele provin din experiențe cu infectare artificială, unde pe parcelele de test se aplică multiplul dozelor materialelor contaminatoare care se găsesc în natură. În producția publică infectare similară se poate constitui numai în cazul în care nu se aplică nici un fel de acțiune de combatere chimică a bolilor și condițiile de propagare pentru patogeni (climaterice, agronomice) sunt foarte favorabile.



MV NÁDOR

Cel mai popular soi de grâu de toamnă din țara noastră. Mv Nádor este cultivat pe 22% din suprafețele destinate producerii, de semințe. Reprezintă o combinație excelentă între productivitate și calitate. Este un soi timpuriu, de talie joasă, cu randament ridicat, ideal pentru morărit, care rămâne competitiv și în sistemele de agricultură intensivă.

PRODUCTIVITATE POTENȚIALĂ

10,0-11,0 t/ha

Szombathely (FIT)	10,40 t/ha
Mosonmagyaróvár (FIT)	9,98 t/ha
Felsőszemeréd	9,54 t/ha
Szarvas (FIT)	9,18 t/ha
Szerencs	8,15 t/ha

Rezultatele recoltei 2023
(FIT: experiment post-înregistrare pe parcele mici)

CALITATE CARACTERISTICĂ

> Tipul semintelor	boabe tari (spic aristat)
> Greutate de o mie de boabe	40 - 50 g
> Conținut de proteină brută	12 - 14 %
> Continut de gluten umed	28 - 34 %
> Grup Farinograf	B1 - A2

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

Recomandat pentru cultivare intensivă, este un soi care necesită un nivel de fertilizare peste medie. În funcție de condițiile meteorologice, sunt recomandate două-trei tratamente fungicide pentru obținerea unei producții record. La alegerea terenului, trebuie evitate solurile cu strat fertil superficial sau de calitate inferioară. Soiul răspunde foarte bine la aplicarea îngrășămintelor foliare și a stimulatorilor de creștere și a aplicării preparatelor pentru stimularea producției. Doza recomandată de îngrășământ este, de 150-200 kg/ha substanță activă de azot.

REZISTENTA LA BOLI

Făinare (<i>Blumeria graminis</i>)									
Rugina galbenă									
Rugina frunzelor									
Rugina tulpinilor									
Pătarea reticulară a frunzelor									
Fuzarioză									

Datele provin din experiențe cu infectare artificială, unde pe parcelele de test se aplică multiplul dozelor materialelor contaminatoare care se găsesc în natură. În producția publică infectare similară se poate constitui numai în cazul în care nu se aplică nici un fel de acțiune de combatere chimică a bolilor și condițiile de propagare pentru patogeni (climaterice, agronomice) sunt foarte favorabile.



MV MÉNRÓT

Soi de grâu pentru morărit, cu randament ridicat și maturitate semitimpurie. Are o toleranță bună la boli și valori nutritive stabile. În condiții favorabile, poate produce peste 10 t/ha. Este unul dintre cele trei soiuri de grâu din Martonvásár cultivate pe cele mai mari suprafețe, alături de Mv Nádor și Mv Nemere.

PRODUCTIVITATE POTENȚIALĂ

9,0 - 10,5 t/ha

Szombathely (FIT)	10,74 t/ha
Felsőzemeréd	9,27 t/ha
Mosonmagyaróvár (FIT)	8,85 t/ha
Szerencs	8,17 t/ha
Martonvásár	7,10 t/ha

Rezultatele recoltei 2023
(FIT: experiment post-înregistrare pe parcele mici)

CALITATE CARACTERISTICĂ

> Tipul semintelor	boabe tari (spic aristat)
> Greutate de o mie de boabe	45 - 50 g
> Conținut de proteină brută	12 - 13 %
> Conținut de gluten umed	30 - 32 %
> Grup Farinograf	A2

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

Recomandat pentru cultivare intensivă. Răspunde foarte bine atât în ceea ce privește producția, cât și calitatea, la o fertilizare abundentă. Pentru obținerea unei producții maxime, aplicarea îngrășămintelor este indicat să fie combinată cu fertilizarea foliară lichidă. Utilizarea îngrășămintelor foliare și a biostimulatorilor contribuie, de asemenea, la acest obiectiv. Necesită protecție fitosanitară adecvată: la nivel tehnologic, este recomandată planificarea unui tratament pentru protecția foliară.

REZISTENȚA LA BOLI

Făinare (<i>Blumeria graminis</i>)	
Rugina galbenă	
Rugina frunzelor	
Rugina tulpinilor	
Pătarea reticulară a frunzelor	
Fuzarioză	

Datele provin din experiențe cu infectare artificială, unde pe parcelele de test se aplică multiplul dozelor materialelor contaminatoare care se găsesc în natură. În producția publică infectare similară se poate constitui numai în cazul în care nu se aplică nici un fel de acțiune de combatere chimică a bolilor și condițiile de propagare pentru patogeni (climaterice, agronomice) sunt foarte favorabile.

MV SEUSO

Un nou soi de grâu timpuriu și cu randament ridicat pentru morărit. În testele oficiale de soi, a produs în medie 8,14 t/ha, depășind media standardelor cu 9,0%. Datorită proprietăților sale agronomice favorabile și capacității intense de utilizare a substanțelor nutritive, poate deveni rapid unul dintre cele mai populare soiuri de grâu.

PRODUCTIVITATE POTENȚIALĂ

9,0 - 10,0 t/ha

Szombathely (FIT)	11,96 t/ha
Mosonmagyaróvár (FIT)	10,69 t/ha
Kocs	10,17 t/ha
Felsőszemeréd	9,82 t/ha
Bükkábrány	9,39 t/ha
Szarvas (FIT)	9,00 t/ha
Reménypuszta	8,67 t/ha
Füzesabony (FIT)	8,03 t/ha
Szerencs	8,03 t/ha
Bóly (FIT)	8,02 t/ha

Rezultatele recoltei 2023
(FIT: experiment post-înregistrare pe parcele mici)

CALITATE CARACTERISTICĂ

› Tipul semintelor	boabe tari (spic aristat)
› Greutate de o mie de boabe	41 - 46 g
› Conținut de proteină brută	12,6 - 15,4 %
› Continut de gluten umed	29 - 34 %
› Grup Farinograf	A2 - B1

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

Recomandat pentru cultivare intensivă: cu o bună aprovizionare cu substanțe nutritive, este indicat să se includă două tratamente fungicide în tehnologia de cultivare și, dacă este necesar, utilizarea unui regulator de creștere. Se recomandă însămânțarea cel târziu în a doua decadă a lunii octombrie, cu o normă de semănat de 4,0-4,5 milioane de boabe germinabile/ha. Doza recomandată de îngrășământ este de 150-180 kg/ha substanță activă de azot.

REZISTENTA LA BOLI

Făinare (<i>Blumeria graminis</i>)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rugina galbenă	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rugina frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rugina tulpinilor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pătarea reticulară a frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuzarioză	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Datele provin din experiențe cu infectare artificială, unde pe parcelele de test se aplică multiplul dozelor materialelor contaminatoare care se găsesc în natură. În producția publică infectare similară se poate constitui numai în cazul în care nu se aplică nici un fel de acțiune de combatere chimică a bolilor și condițiile de propagare pentru patogeni (climaterice, agronomice) sunt foarte favorabile.

MV FELLEG

Un nou soi de grâu timpuriu, cu randament ridicat și o calitate apropiată de categoria premium pentru panificație. Calitatea sa tehnologică excelentă se datorează predecesorului său, soiului popular Mv Kolo, însă îl depășește semnificativ în ceea ce privește producția.

PRODUCTIVITATE POTENȚIALĂ

8,5 - 9,5 t/ha

Szombathely (FIT)	10,09 t/ha
Mosonmagyaróvár (FIT)	9,49 t/ha
Kocs	9,00 t/ha
Felsőszemeréd	8,42 t/ha
Szihalom	8,22 t/ha
Szarvas (FIT)	8,09 t/ha
Bacsa	7,58 t/ha
Reménypuszta	7,54 t/ha

Rezultatele recoltei 2023
(FIT: experiment post-înregistrare pe parcele mici)

CALITATE CARACTERISTICĂ

Tipul semintelor	boabe tari (spic aristat)
Greutate de o mie de boabe	40 - 45 g
Conținut de proteină brută	13 - 15 %
Conținut de gluten umed	25 - 35 %
Grup Farinograf	A1 - A2

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

Recomandat pentru cultivare intensivă. Se recomandă o fertilizare de înalt nivel și planificarea a două tratamente fungicide. Pentru obținerea unei bune calități de morărit, sunt recomandate două fertilizări suplimentare, iar pentru realizarea calității premium, trei fertilizări suplimentare. Pentru atingerea potențialului maxim al soiului, utilizarea îngrășămintelor foliare și a biostimulatoarelor, pe lângă îngrășămintele de bază, poate fi benefică. Doza recomandată de îngrășământ este, de 140-170 kg/ha substanță activă de azot.

REZISTENȚA LA BOLI

Făinare (<i>Blumeria graminis</i>)	
Rugina galbenă	
Rugina frunzelor	
Rugina tulpinilor	
Pătarea reticulară a frunzelor	
Fuzarioză	

Datele provin din experiențe cu infectare artificială, unde pe parcelele de test se aplică multiplul dozelor materialelor contaminatoare care se găsesc în natură. În producția publică infectare similară se poate constitui numai în cazul în care nu se aplică nici un fel de acțiune de combatere chimică a bolilor și condițiile de propagare pentru patogeni (climaterice, agronomice) sunt foarte favorabile.



MV KONDÁS

Soi nou de grâu cu randament ridicat, destinat furajării și unor utilizări de calitate specială, cu maturitate semitimpurie. Are un potențial de producție de peste 10 t/ha. Recomandat producătorilor care urmăresc obținerea unor randamente mari, fiind un soi cultivabil în mod rentabil, în special datorită rezistenței sale excelente la boli.

PRODUCTIVITATE POTENTIALĂ

9,0 - 11,0 t/ha

Szombathely (FIT)	11,37 t/ha
Mosonmagyaróvár (FIT)	11,14 t/ha
Felsőszemeréd	9,55 t/ha
Füzesabony (FIT)	9,07 t/ha
Bacsa	8,55 t/ha
Martonvásár	8,53 t/ha

Rezultatele recoltei 2023
(FIT: experiment post-înregistrare pe parcele mici)

CALITATE CARACTERISTICĂ

› Tipul semintelor	Boabe moi (spic fără ariste)
› Greutate de o mie de boabe	35 - 42 g
› Conținut de proteină brută	10 - 12 %
› Continut de gluten umed	25 - 28 %
› Grup Farinograf	C1

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

Recomandat pentru cultivare intensivă, își valorifică potențialul maxim, de producție la un nivel ridicat de fertilizare. Aplicarea îngrășămintelor solide este indicat să fie combinată cu fertilizarea lichidă, iar la nivel tehnologic se recomandă două tratamente cu îngrășăminte foliare, eventual completate cu produse pe bază de alge (alge/bacterii) pentru suplimentarea elementelor mezo- și micro-nutritive limitative. Deși are o bună rezistență la boli, utilizarea unei tehnologii intensive necesită aplicarea unor tratamente pentru protecția frunzelor și a spicului. Doza recomandată de îngrășământ este de 140-170 kg/ha substanță activă de azot.

REZISTENTA LA BOLI

Făinare (<i>Blumeria graminis</i>)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rugina galbenă	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rugina frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rugina tulpinilor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pătarea reticulară a frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuzarioză	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Datele provin din experiențe cu infectare artificială, unde pe parcelele de test se aplică multiplul dozelor materialelor contaminatoare care se găsesc în natură. În producția publică infectare similară se poate constitui numai în cazul în care nu se aplică nici un fel de acțiune de combatere chimică a bolilor și condițiile de propagare pentru patogeni (climaterice, agronomice) sunt foarte favorabile.



**Elitmag Kft.**

📍 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
✉ 2462 Martonvásár, Pf. 26.
☎ +36 22 569 230
✉ info@elitmag.com
🌐 www.elitmag.com

Nagy-Magda Mária

administrator de comerț intern și exterior

☎ +40 770 624 829 | +36 30 604 6208
✉ magda.maria@elitmag.com



SIMBOLULE EXPLICATIE



Protecție
a soiului UE



Protecție
a soiului
națională



Tip de
spic aristat



Tip de spic
glabru



Grupă
panificație



Productivitate
ridică



Calitate
de morărit
clasa I



Utilizare
specială



Toleranță
excelentă
a boli



Rezistență
excelentă
la stres



Utilizare
pentru
furaj